

**А.И. Неймарк  
Б.А. Неймарк  
Ю.С. Кондратьева**



**БИБЛИОТЕКА  
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА**

**УРОЛОГИЯ**

# **Дизурический синдром у женщин**

## **Диагностика и лечение**

**Москва**



**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  
«ГЭОТАР-Медиа»**

**2010**

# Глава 1

---

## Современные представления о причинах развития стойкой дизурии у женщин

### 1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ СТОЙКОЙ ДИЗУРИИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ

Термин «болезненный мочевой пузырь» часто встречается у урологических больных. Основным клиническим проявлением является стойкая дизурия, которая плохо поддается лечению.

По данным литературы, к заболеваниям с расстройством мочеиспускания у женщин относятся:

- хронический неспецифический цистит;
- цисталгия;
- уретрит;
- туберкулез мочевых путей (Хайрлиев Г.З., 1990; Gregoire M., Sirois A., 1997).

В то же время есть ряд заболеваний мочевого пузыря со стойкой симптоматикой, причина и патогенез которых остаются неизвестными. Гистологические исследо-